

CONSENTEMENT ECLAIRE - INJECTION DE PRODUITS DE COMBLEMENT

Le mode d'utilisation, les indications et contre-indications ainsi que les potentiels effets secondaires des produits suivants m'ont été expliqués :
Juvederm - Surgiderm - Voluma - Stylage - Esthelis - Glytone - Filorga -
Autres ...

J'ai répondu franchement à toutes les questions qui m'ont été posées concernant mes antécédents médicaux et esthétiques.

J'ai pu poser toutes les questions que je souhaitais et des réponses satisfaisantes m'ont été apportées.

J'ai été informée que :

- les produits utilisés sont des gels d'acide hyaluronique homogènes et bio-résorbables d'origine non animale.
- ces produits sont injectés en intradermique pour le traitement des dépressions cutanées (rides) et/ou des lèvres, ou pour l'amélioration de l'hydratation et de l'élasticité cutanée.
- Dans le traitement des rides et des lèvres, la tenue moyenne des ces produits est de 6 à 12 mois. Cette tenue dépend notamment du type de peau, des zones, et des quantités injectées, de la technique d'injection mais aussi de l'hygiène de vie du patient.
- Cette durée peut être moindre dans les lèvres du fait de leur forte vascularisation.
- Une retouche si nécessaire quelques semaines après les premières injections permet de prolonger et d'optimiser les résultats.

J'ai bien été informée qu'à l'issue de l'injection de :

Juvederm - Surgiderm - Voluma - Stylage - Esthelis - Glytone - Filorga -
Autres ...

- Des réactions inflammatoires telles que rougeur, gonflement œdème, érythème ... potentiellement associées à des démangeaisons ou à des douleurs à la pression peuvent survenir après l'injection qui peuvent persister environ une semaine.
- Des réactions infectieuses peuvent survenir : avertir votre médecin en cas de rougeur, chaleur douleur locale...
- Des hématomes, indurations ou nodules peuvent apparaître au point d'injection.
- De très rares cas de coloration ou de décoloration de la zone injectée ont été rapportés.

De plus, j'ai été prévenue que suite à des injections d'acide hyaluronique, de rare cas de nécrose dans la région de la glabelle, d'abcès, de granulome ou d'hypersensibilité ont été mentionnés dans la littérature.

La persistance de réactions inflammatoires au-delà d'une semaine ou l'apparition de tout autre effet indésirable doit être signalée au praticien dans les meilleurs délais. Le praticien devra y remédier par un traitement approprié.

Ces effets indésirables peuvent nécessiter pour disparaître un traitement qui peut durer plusieurs mois.

J'ai bien pris connaissance des conseils aux patients et m'engage à les suivre.

Date

Signature